**Листок-вкладыш – информация для пациента**

Септолете® тотал эвкалипт таблетки для рассасывания 3 мг/1 мг
Бензидамина гидрохлорид / Цетилпиридиния хлорид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается после 3-х дней применения препарата, вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Септолете тотал эвкалипт, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Септолете тотал эвкалипт
3. Применение препарата Септолете тотал эвкалипт
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Септолете тотал эвкалипт
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ ЭВКАЛИПТ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Таблетки для рассасывания Септолете тотал эвкалипт применяют для местного симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (например, тонзиллит, фарингит, стоматит, гингивит) у взрослых и детей с 6 лет.

Если через 3 дня лечения состояние не улучшается, или вы чувствуете себя хуже, то следует обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ ЭВКАЛИПТ**Не применяйте Септолете тотал эвкалипт**

- если у вас аллергия на бензидамина гидрохлорид, цетилпиридиния хлорид или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша),
- это лекарственное средство не следует применять у детей младше 6 лет, так как данная лекарственная форма не подходит для этой возрастной группы.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением Септолете тотал эвкалипт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат не следует применять более 7 дней. При отсутствии заметных признаков улучшения состояния после 3 дней лечения, а также при ухудшении самочувствия и появлении лихорадки, следует обратиться к врачу.

Лекарственные формы для местного применения могут вызвать реакции гиперчувствительности, особенно при длительной терапии. В таком случае лечение рекомендуется прекратить.

Септолете тотал эвкалипт не следует применять одновременно с анионными соединениями (например, которые присутствуют в зубной пасте). Соответственно, не рекомендовано применение препарата непосредственно до или после чистки зубов.

Септолете тотал эвкалипт не содержит сахар, следовательно, может применяться у пациентов с сахарным диабетом или находящихся на низкокалорийной диете.

Применение у детей и подростков

Септолете тотал эвкалипт не следует применять у детей младше 6 лет, так как данная лекарственная форма не подходит для этой возрастной группы.

Другие препараты и препарат Септолете тотал эвкалипт

Перед началом приёма необходимо сообщить врачу о том, что вы принимаете или недавно принимали какие-либо лекарственные средства.

Не рекомендовано одновременное применение Септолете тотал эвкалипт с препаратами из группы антисептиков.

Септолете тотал эвкалипт с пищей и напитками

Не применяйте Септолете тотал эвкалипт непосредственно перед едой или во время приема пищи или молока, т.к. одновременное применение с пищей или молоком может снизить местные антисептические свойства цетилпиридиния хлорида.

Не следует принимать пищу или употреблять жидкость как минимум в течение одного часа после применения препарата.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Применение Септолете тотал эвкалипт во время беременности не рекомендуется.

Если вы кормите грудью, необходимо проконсультироваться с врачом, который примет решение о прекращении применения Септолете тотал эвкалипт или приостановлении грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Септолете тотал эвкалипт не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

Септолете тотал эвкалипт содержит изомальтит (E953)

Пациентам, имеющим непереносимость некоторых сахаров, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ ЭВКАЛИПТ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Взрослые

Рекомендуемая доза составляет 3 - 4 таблетки в день.

Таблетки следует медленно рассасывать во рту каждые 3 - 6 часов.

Дети старше 12 лет

Рекомендуемая доза составляет 3 - 4 таблетки в день.

Таблетки следует медленно рассасывать во рту каждые 3 - 6 часов.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет

Рекомендуемая доза составляет 3 таблетки в день.

Таблетки следует медленно рассасывать во рту каждые 3 - 6 часов.

Дети младше 6 лет

Септолете тотал эвкалипт не следует применять у детей младше 6 лет, так как данная лекарственная форма не подходит для этой возрастной группы.

Не следует превышать рекомендуемые дозы.

Не применяйте Септолете тотал эвкалипт непосредственно перед едой или во время приема пищи.

Не следует принимать пищу или употреблять жидкость как минимум в течение одного часа после применения препарата.

Для достижения оптимального эффекта не следует применять препарат непосредственно до или сразу после чистки зубов.

Продолжительность лечения

Препарат не следует применять в течение более 7 дней. При отсутствии признаков улучшения состояния (или в случае его ухудшения) после 3 дней лечения, а также при появлении лихорадки, следует проконсультироваться с врачом.

Если вы применяли Септолете тотал эвкалипт больше, чем следовало

При применении доз, превышающих рекомендуемые, следует немедленно обратиться к врачу или в ближайшее учреждение здравоохранения. Смертельная доза для человека составляет около 1 - 3 г (что соответствует примерно 1000-3000 таблеток одновременно).

Если вы забыли применить препарат

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ


Подобно всем лекарственным средствам этот препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Редко (могут возникать менее чем у 1 человека из 1 000):

- крапивница, повышение чувствительности кожи к солнечному свету (фоточувствительность),
- внезапное неконтролируемое сужение дыхательных путей (бронхоспазм).

Очень редко (могут возникать менее чем у 1 человека из 10 000):

25.11.2020



страница 3 из 5

- локальное раздражение слизистой оболочки полости рта, легкое ощущение жжения в полости рта.

Частота не известна (не может быть установлена на основе имеющихся данных):

- аллергические реакции (гиперчувствительность),
- серьезные аллергические реакции (анафилактический шок), с такими признаками как затруднение дыхания, боль или чувство сдавленности в грудной клетке и / или чувство головокружения / обморока, сильный зуд кожи или высыпания в виде выступающих уплотнений на коже, отек лица, губ, языка и / или горла, которые могут быть потенциально жизнеугрожающими,
- чувство жжения или онемения (потеря чувствительности) слизистой оболочки полости рта.

Следуя рекомендациям по применению, представленным в данном листке-вкладыше, вы снижаете риск возникновения побочных реакций.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Сообщения о нежелательных реакциях также могут быть направлены:

- представителю производителя: Представительство Акционерного Общества «KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D. D., NOVO MESTO» (Республика Словения) в Республике Беларусь: 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Филимонова, д. 25г, офис 315. Тел/факс +3757407409230. E-mail: info.by@krka.biz.
- в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: по адресу Товарищеский переулок, 2а, г. Минск, 220037, Республика Беларусь, тел/факс 242-00-29, по электронной почте rcpl@rceth.by или на сайте www.rceth.by.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ ЭВКАЛИПТ

Не требует особых температурных условий хранения.

Хранить в оригинальной упаковке с целью защиты от света.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в водопровод или канализацию.

Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не требуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Септолете тотал эвкалипт содержит

Каждая таблетка для рассасывания содержит 3 мг бензидамина гидрохлорида и 1 мг цетилпиридиния хлорида в виде цетилпиридиния хлорида моногидрата.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Национальный центр экспертиз и испытаний в здравоохранении
Республики Беларусь

25.11.2020

страница 4 из 5

9129 - 2016

Вспомогательные вещества: эвкалиптовое масло, левоментол, сукралоза (E955), лимонная кислота безводная (E330), изомальтит (Тип М) (E953), бриллиантовый голубой (E133).

Внешний вид препарата Септолете тотал эвкалипт и содержимое упаковки

Круглые таблетки для рассасывания со скошенными краями и шероховатой поверхностью, от светло-голубого до синего цвета. Допускается наличие участков белого цвета, неравномерного окрашивания, пузырьков воздуха в массе таблетки и небольших зазубренных краев.

Упаковка:

8 таблеток для рассасывания в блистерах (ПВХ/ПЭ/ПВДХ пленка и алюминиевая фольга). 8, 16, 24 или 32 таблетки для рассасывания в коробке с листком-вкладышем.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

КРКА, д. д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.

